

この説明文書は使用前に必ずお読みください。また必要なとき読めるように保存しておいてください。

第3類医薬品

のどの殺菌・消毒, 口臭除去に 口腔内殺菌消毒薬

# イソジン<sup>®</sup> うがい薬P

イソジンうがい薬Pは、有効成分ポビドンヨードを含むうがい薬です。  
口中からのどにすぐれた殺菌・消毒効果があります。

特徴

- 有効成分ポビドンヨードが、ヨウ素を遊離し、各種の細菌、真菌、ウイルスなど広範囲の微生物に対して迅速な殺菌・消毒効果を発揮します。
- イソジンうがい薬Pは、有効成分ポビドンヨードの殺菌・消毒効果と、うがいによる洗浄効果により、口腔内およびのどの殺菌・消毒、口臭の除去にすぐれた効果を示します。

## ⚠ 使用上の注意

### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)  
次の人は使用しないでください

本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人

### 相談すること



1.次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

(1)薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人

(2)次の症状のある人

　　口内のひどいだれ

(3)次の診断を受けた人

　　甲状腺機能障害

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感

関係部位	症 状
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

## 効能・効果

口腔内およびのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

## 用法・用量

1回、本剤2～4mLを水約60mLにうすめて、1日数回うがいしてください。

〈用法・用量に関する注意〉

●定められた用法・用量を厳守してください。

●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

●本剤はうがい用のみに使用し、キズややけどへの使用や、内服はしないでください。

●目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

●本剤は使用するときにうすめて、早めに使用してください。

## 成分・分量

1mL中 ポビドンヨード70mg(有効ヨウ素として7mg)

添加物として エタノール、I-メントール、クエン酸、リン酸水素ナトリウム、サッカリンナトリウム、pH調整剤、香料、トコフェロール、プロピレン glycoleを含有しています。

〈成分・分量に関する注意〉

●本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯など)が変色することがあります。

## 保管および取扱い上の注意

(1)直射日光の当らない涼しい所に密栓して保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変化します。)

(4)衣服などに付着すると着色しますのでご注意ください。

なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落してください。

(5)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。

## お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、

または下記までお願ひいたします。

シオノギヘルスケア株式会社「医薬情報センター」

電話：[大阪] 06-6209-6948

[東京] 03-3406-8450

受付時間：9時～17時(土、日、祝日を除く)

## 「副作用被害救済制度」について

(独)医薬品医療機器総合機構

電話：0120-149-931 (フリーダイヤル)

[https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)