



多言語対応で読み上げてくれるよ。スキャンしてね。  
It supports display and voice reading in multiple languages.

製品特徴  
Product features  
QR Translator



この説明文書は服用前に必ずお読みください。また必要なとき読めるように保存しておいてください。

総合かぜ薬（非ピリン系）

販売名：パイロンPL錠 ゴールド

第2類医薬品

SHIONOGI

# パイロン<sup>®</sup>PL錠 ゴールド

パイロンPL錠 ゴールドは、解熱鎮痛成分であるサリチルアミドとアセトアミノフェン、抗ヒスタミン成分であるプロメタジンメチレンジサリチル酸塩、痛みを抑えるはたらきを助ける無水カフェイン、せき中枢を抑えて、せきをしずめるデキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、たんを出しやすくするブロムヘキシン塩酸塩の6つの有効成分の作用により、「せき」「たん」「のどの痛み」「発熱」「鼻みず」などのかぜの11症状にすぐれた効果を発揮する非ピリン系の総合かぜ薬です。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります）

- 次の人は服用しないでください  
(1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人  
(2) 本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくをおこしたことがある人  
(3) 15才未満の小児
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など）
- 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください（眠気などがあらわれることがあります）
- 服用前後は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください  
(1) 医師または歯科医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人  
(3) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人  
(4) 次の症状のある人 高熱、排尿困難  
(5) 次の診断を受けた人 心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

| 関係部位  | 症 状         | 関係部位  | 症 状      |
|-------|-------------|-------|----------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ   | 呼 吸 器 | 息切れ、息苦しさ |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 | 泌 尿 器 | 排尿困難     |
| 精神神経系 | め ま い       | そ の 他 | 過度の体温低下  |

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称                                                        | 症 状                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー)                                           | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。                                |
| 皮膚粘膜眼症候群<br>(スティーブス・ジョンソン症候群)、<br>中毒性表皮壊死融解症、<br>急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がないなどが持続したり、急激に悪化する。 |
| 薬剤性過敏症症候群                                                    | 皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リン/関節（首、わきの下、股の付け根など）のはれなどがあらわれる。                              |
| 肝機能障害                                                        | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる。                                          |
| 腎障害                                                          | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢などがあらわれる。                                            |
| 間質性肺炎                                                        | 階段を上ったり、少し無理をしただけで息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。                          |
| ぜんそく                                                         | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しいなどがあらわれる。                                                          |

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください  
□のかわき、眠気
- 5～6 回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください



## 効能・効果

かぜの諸症状（せき、たん、のどの痛み、発熱、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、悪寒（発熱によるさむけ）、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和



## 用法・用量

次の量を食後なるべく 30 分以内に、水またはぬるま湯でおのみください。

| 年 齢        | 1 回量     | 1 日服用回数 |
|------------|----------|---------|
| 成人（15 才以上） | 2 錠      | 3 回     |
| 15 才未満     | 服用させないこと |         |

●定められた用法・用量を厳守してください。

●錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っている PTP シートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出しておのみください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながることがあります。）

錠剤の取り出し方

指で押し出す



取り出しのむこう



## 成分・分量

パイロンPL錠 ゴールドは、白色の錠剤で、6 錠（成人 1 日量）中に次の成分を含有しています。

| 成 分                  | 含量（6 錠中） | はたらき               |
|----------------------|----------|--------------------|
| サリチルアミド              | 648mg    | 痛みをおさえ、熱を下げる       |
| アセトアミノフェン            | 360mg    |                    |
| 無水カフェイン              | 144mg    | 痛みをおさえるはたらきを助ける    |
| プロメタジンメチレンジサリチル酸塩    | 32.4mg   | 鼻みず、鼻づまり、くしゃみをおさえる |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 | 48mg     | せきをしずめる            |
| ブロムヘキシン塩酸塩           | 12mg     | たんの切れをよくする         |

添加物として 乳糖水和物、トウモロコシデンプン、クロスカルメロースナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。



## 保管および取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- PTP シートから出して他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変化します）
- 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



**かぜをひいた時は、しっかり休むこと、栄養を摂ることが大事。  
かぜでつらい時は、かぜ薬の活用も有効です。**

## 「かぜかも…」と、なってしまうまえに

1

外から帰ったら、  
「手洗い」「うがい」を  
習慣づけましょう。



かぜの原因の8～9割は、ウイルスによるもの。「手洗い」には石鹸とお湯を、「うがい」にはうがい薬を使えば、効果的です。

2

日頃から体の  
コンディションを  
整えましょう。



体のコンディションが良くないと、ウイルスに感染しやすくなります。ストレスや疲れをためず、しっかりと睡眠をとり、体力と免疫力を高めましょう。

3

毎日の食事にも  
きちんと気を  
配りましょう。



さまざまな免疫力に関わるビタミンC、ビタミンAが多く含まれる、緑黄色野菜や果物などを、積極的に食べるよう、心がけてください。

4

こまめな換気で  
室内の空気を  
入れ替えましょう。



室内の空気をきれいに保つため、新鮮な空気を取り込むようにしましょう。冬場は空気が乾燥しているため、加湿器などで湿度を保ちましょう。

## 「かぜかも…」と、なってしまったときは

1

まずは安静第一、  
しっかり体を  
休めましょう。



湿度を高めた暖かい部屋で、十分な睡眠をとりましょう。汗をかいたら、よく拭き取り、体を冷やさないようにしてください。

2

熱がなければ、  
お風呂でゆっくり  
温まりましょう。



お風呂の湯気は、鼻やのどの粘膜に潤いを与えてくれます。体力の消耗の少ない、ぬるめのお湯にゆっくり入ってください。ただし長湯は禁物です。

3

食欲がなくても、  
きちんと栄養を  
摂りましょう。



消化が良く栄養価の高いものを食べましょう。汁ものの料理は、体が温まり、水分補給にもなるのでおすすめです。

4

せきエチケットを  
心がけましょう。



せきやくしゃみの飛沫にはウイルスが含まれているかもしれません。飛沫の拡散を防ぐために、マスクの着用を心がけましょう。



### お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。  
●シオノギヘルスケア株式会社「医薬情報センター」  
電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450  
受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について  
●(独)医薬品医療機器総合機構  
[https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話：0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元

**シオノギヘルスケア株式会社**

大阪市北区大深町5番54号

®:登録商標

製品特徴  
Product features  
QR Translator.

