



多言語対応で読み上げてくれるよ。スキャンしてね。  
It supports display and voice reading in multiple languages.

製品特徴  
Product features  
QR Translator



この説明文書は服用前に必ずお読みください。また必要なとき読めるように保存しておいてください。

鎮咳去痰薬（非麻薬性）

販売名：メジコンせき止め液Pro

# メジコン®せき止め液Pro

第2類医薬品

SHIONOGI

メジコンせき止め液Proは、せき中枢に直接作用し、せきをしずめるデキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、たんを出しやすくするクレゾールスルホン酸カリウムの2つの有効成分の作用により、つらいせき・たんの症状にすぐれた効果を発揮する非麻薬性のせき止め薬です。

よくお読み  
ください

## 使用上の注意



### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります）

- 次の人は服用しないでください  
本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など）
- 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください  
（眠気などがあらわれることがあります）

| 関係部位  | 症 状         |
|-------|-------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ   |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい         |
| 呼 吸 器 | 息苦しさ、息切れ    |

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称              | 症 状                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| ショック<br>（アナフィラキシー） | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。 |



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください  
（1）医師の治療を受けている人  
（2）妊婦または妊娠していると思われる人  
（3）薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人  
（4）次の症状のある人 高熱
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください 眠気
- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
- 症状の改善が見られても2週間を超えて服用する場合は、医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください



## 効能・効果

せき、たん



## 用法・用量

次の1回量を1日3回、おのみください。また、おのみになる間隔は4時間以上おいてください。

- 定められた用法・用量を厳守してください。

| 年 齢       | 1 回 量    |
|-----------|----------|
| 成人(15才以上) | 6mL      |
| 15才未満     | 服用させないこと |

お子さまが簡単に開けられない安全キャップを採用しています。

### ●開け方

- ①キャップを下に押しながら
- ②反時計まわりに回して開ける

### ●閉め方

瓶の口をよく拭いてから普通のキャップを閉める要領で閉める

### 正しい服用の仕方

計量カップのフチに瓶の口をあてて、1回量(6mL)を注いでください。  
1回量を必ず守って、服用してください。

※瓶は平らなところに置いてください。



## 成分・分量

メジコンせき止め液Proは淡黄褐色澄明の粘稠な液体で、18mL（成人1日量）中に次の成分を含有しています。


| 成 分                  | 含量(18mL中) | はたらき       |
|----------------------|-----------|------------|
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 | 45mg      | せきをしずめる    |
| クレゾールスルホン酸カリウム       | 270mg     | たんの切れをよくする |

添加物として エタノール、白糖、カラメル、安息香酸、水酸化ナトリウム、安息香酸ベンジル、エチルパニリン、グリセリン、パニリン、香料を含有しています。



## 保管および取扱い上の注意

- 光に当たると退色するため、日光や蛍光灯などに当たらないようにして、涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 計量カップは、使用後水洗いなどして、清潔に保管してください。
- キャップを閉める際は、瓶の口をよく拭いてから閉めてください。瓶の口に薬液が付着したままキャップを閉めると、まれに開けにくくなる場合があります。また、閉め方が悪いと内容液が漏れ出たり汚染することがあります。
- キャップが開けにくい場合は、キャップ部分をお湯（50～60℃）につけると開けやすくなります。
- 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



## お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。

●シオノギヘルスケア株式会社「医薬情報センター」  
電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450  
受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について

●（独）医薬品医療機器総合機構  
[https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話：0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元

シオノギヘルスケア株式会社

大阪市北区大深町5番54号

®登録商標

## 【メジコンせき止め液Proのご使用に際して】

### ×「せき・たん」をしずめる目的以外で使用しないでください。

メジコンせき止め液Proを有効かつ安全にご使用いただくために、用法・用量などの使用方法が定められています。用法・用量を超えて服用すると、重大な健康被害につながるおそれがあります。ご使用の際は、「使用上の注意」をよく読んで、用法・用量などを厳守して正しくご使用ください。

こちらにアクセスいただくと、  
さまざまな相談窓口情報をご覧いただけます。



↑ 相談窓口情報

誤って過量服用された場合は直ちに医師の診察を受けてください。

## せきがひどくなる前に。予防が大切です。

### 1 「うがい」をしましょう。



のどの粘膜には、空気中から取り込んだウイルスや菌が付着していることも。ウイルスや菌を体内に入れないよう、うがいをするを習慣にしましょう。

### 2 「手洗い」をしましょう。



あらゆるものに触れる手には、ウイルスや菌が付着している可能性が。石鹸とお湯を使った手洗いを、こまめに行うことを心がけましょう。手をいつも清潔に保ちましょう。

### 3 定期的に水分を摂りましょう。



のどはウイルスや菌などの異物を排出する役割を担っています。のどが乾燥すると、この機能が低下してしまいます。こまめに水分補給を行い、のどが潤った状態を保ちましょう。

## 「せきが出る…」そんな時は、せきエチケットを守りましょう。

### 1 マスクを着用する。 (口・鼻を覆う)



### 2 ティッシュ・ハンカチで 口・鼻を覆う。



マスクがない時

### 3 袖で口・鼻を覆う。



とっさの時

メジコンせき止め液Proを服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください（眠気などがあらわれることがあります）

シオノギヘルスケアは、セルフケア社会の実現に向けた情報提供を進めています。

製品特徴  
Product features  
QR Translator

