



多言語対応で読み上げられるよ。スキャンしてね。
It supports display and voice reading in multiple languages.

製品特徴
Product features
QR Translator



この説明文書は服用前に必ずお読みください。また必要なとき読めるように保存しておいてください。

去痰薬

日本薬局方 L-カルボシステイン錠

販売名：ムコダイン去たん錠Pro500

ムコダイン®去たん錠Pro 500

第2類医薬品

SHIONOGI

ムコダイン去たん錠Pro500はL-カルボシステインの作用により、
たんの切れをよくする去たん薬です。



⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用・事故がおこりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 授乳中の人
 - (4) 高齢者
 - (5) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
 - (6) 次の症状のある人 高熱
 - (7) 次の診断を受けた人 心臓病、肝臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、下痢、腹痛、腹部膨満感、口のかわき
呼 吸 器	息苦しさ
そ の 他	発熱、むくみ

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤などが持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる。

3. 5～6 回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
また、症状の改善がみられても 2 週間を超えて服用する場合は、医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください



効能・効果

たん



用法・用量

次の量を水またはぬるま湯でおのみください。また、おのみになる間隔は
4 時間以上おいてください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15 才以上）	1 錠	3 回
15 才未満	服用させないこと	

●定められた用法・用量を厳守してください。

●錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っている PTP シートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出しておのみください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながる可能性があります。）



成分・分量

ムコダイン去たん錠Pro500 は、白色のフィルムコーティング錠で、3 錠（成人 1 日量）中に次の成分を含有しています。


成 分	含量（3 錠中）	はたらき
L-カルボシステイン	1500mg	たんの切れをよくする

添加物として クロスカルメロースナトリウム、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、ショ糖脂肪酸エステル、ステアリン酸マグネシウム、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、タルクを含有しています。



保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) PTP シートから出して他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり、品質が変化します）
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。

●シオノギヘルスケア株式会社「医薬情報センター」

電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450

受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について

●(独) 医薬品医療機器総合機構

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話：0120-149-931（フリーダイヤル）

®登録商標

製造販売元

シオノギヘルスケア株式会社

大阪市北区大深町5番54号

「たん」が絡みつくのはなぜ？

のどの粘膜は常に粘液を出し、ウイルスや細菌などを粘液でキャッチすることで体内への侵入を防いでいます。しかし、外からの侵入が増えると、よりキャッチしやすくするために、より高い粘度の粘液をつくるようになります。粘度が高くなると、のどに絡みつくようになり体外に吐き出しにくくなります。これが「たんが絡む」現象です。

たんが絡むと、たんを体外に排出しようと「せき」症状がおこる場合があります。



L-カルボシステインの作用

ムコダイン去たん錠Pro500の有効成分L-カルボシステインは「たん」を構成する気道粘液を正常化することで粘度を減らし、サラサラにし、出しやすくする作用があります。また、気道粘膜を修復することでも、たんを出しやすくしています。

のどに絡む
粘度の高い粘液
「たん」

ムコダイン
(L-カルボシステイン)
が作用

気道粘液を正常化し、
サラサラに

気道粘膜を修復

体外へ
出しやすい状態

「たん」がひどくなる前に、予防が大切です。

1

「うがい」をしましょう。



のどの粘膜には、空気中から取り込んだウイルスや菌が付着していることも。ウイルスや菌を体内に入れてしまわないよう、うがいをすることを習慣にしましょう。

2

「手洗い」をしましょう。



あらゆるものに触れる手には、ウイルスや菌が付着している可能性が。石鹸とお湯を使った手洗いを、こまめに行うことを心がけましょう。手をいつも清潔に保ちましょう。

3

定期的に水分を
摂りましょう。



のどはウイルスや菌などの異物を排出する役割を担っています。のどが乾燥すると、この機能が低下してしまいます。こまめに水分補給を行い、のどが潤った状態を保ちましょう。

Q & A

Q

どのような症状・シーンにムコダイン去たん錠Pro500を使用すればよいですか？

本品は「たんの切れをよくする」お薬です。たんが絡んで気になる際にご使用ください。(例：たんが絡んでせきがでる、たんが気になって眠れないなど)

Q

妊娠中、授乳中は服用してもよいですか？

医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

