

＜商品をご使用いただく際のお願い＞

メジコンせき止め液Pro服用後にキャップをしめる際は、
瓶の口をよく拭いてからしめてください。

薬液が付着したまましめると、開けにくくなる場合があります。

キャップが開けにくい場合は、
キャップ部分をお湯(50～60℃)につけると開けやすくなります。



第2類医薬品 鎮咳去痰薬

メジコン®せき止め液 Pro

使用前の自己チェック表

説明文書及び本冊子をよく読んだ上で使用してください。

- ☐ このお薬を「せき、たん」の症状に使用する
(P.1「このお薬の効果は」を参照ください)
- ☐ このお薬を使用できるか確認した
(P.2「このお薬を使う前に、確認すべきことは」を参照ください)
- ☐ このお薬を使用できるのは15才以上である
- ☐ このお薬の使い方は1回 6mL、1日3回である
(P.2「このお薬の使い方は」をご参照ください)
- ☐ このお薬の使用中に同時に使用できないお薬があることを理解した
- ☐ このお薬の使用中に眠気があらわれることがあるため、乗物または機械類の運転操作をしてはいけないことを理解した
(P.3「このお薬の使用中に気をつけなければならないことは」をご参照ください)
- ☐ 可能性のある副作用について理解した
(P.3「副作用は」をご参照ください)

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。

シオノギヘルスケア株式会社「医薬情報センター」
電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450
受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について

(独)医薬品医療機器総合機構

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

使用者向け情報提供資料

SHIONOGI
シオノギヘルスケア

第2類医薬品 鎮咳去痰薬

メジコン®せき止め液 Pro

(配合成分) デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、クレゾールスルホン酸カリウム



QR Translator



製品特徴
Product
features

ご使用前に必ずお読みください

本冊子は、鎮咳去痰薬である「メジコン®せき止め液Pro」を正しくお使いいただくための説明書です。「メジコン®せき止め液Pro」を有効かつ安全にご使用いただくために、用法・用量などの使用方法が定められています。用法・用量を超えて服用すると、重大な健康被害につながるおそれがあります。ご使用の際は、本冊子と説明文書をよく読んで、用法・用量などを厳守して正しくご使用ください。
製品特徴は上記のQRコードのリンク先でも説明しています。

税 控除 対象

この医薬品は「使用上の注意」をよく読んでお使いください。
アレルギー体質の方は、必ず薬剤師、登録販売者にご相談ください。

つらいせき・たんに

第2類医薬品

メジコン® せき止め液 Pro

メジコンせき止め液Proは、
つらいせき・たんの症状に
効果を発揮するせき止め薬です。



成分及び分量
(成人1日量: 18mL中)

デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
クレゾールスルホン酸カリウム

45mg
270mg

このお薬の効果は？

効能・効果

せき、たん

メジコンせき止め液Proは、鎮咳薬のデキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物と去たん薬のクレゾールスルホン酸カリウムの配合剤です。

- デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物は、せき中枢に直接作用し、せきをしずめます。
- クレゾールスルホン酸カリウムは、気道の分泌を促し、たんの粘性を下げ、たんの切れをよくします。

このお薬を使う前に、確認すべきことは？

- 1.次の項目に該当する方は、このお薬を服用できません。
☐本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人
- 2.このお薬を服用している間は、他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など)は使用しないでください。
- 3.次の項目にひとつでも該当する方は、このお薬を服用できない可能性があります。購入される前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
☐医師の治療を受けている人 ☐妊婦または妊娠していると思われる人
☐薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
☐次の症状のある人 高熱

このお薬の使い方は？



「せき・たん」をしずめる目的以外で使用しないでください。
誤って過量服用された場合は直ちに医師の診察を受けてください。

【用法・用量】 成人(15才以上)は、1回 6mLを1日3回おのみください。
また、おのみになる間隔は4時間以上おいてください。


お子さまが簡単に開けられない安全キャップを採用しています。

安全キャップの
使用方法



※瓶は平らなところにおいてください。

正しい服用の
仕方



計量カップのフチに瓶の口をあてて、
1回量(6mL)を注いでください。
1回量を必ず守って、服用してください。

- ☐5〜6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、このお薬の説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
- ☐症状の改善がみられても2週間を超えて服用する場合は、医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

このお薬の使用中に気をつけなければならないことは？

このお薬を服用した後、乗物または機械類の運転操作をしないでください。
(眠気などがあらわれることがあります)



副作用は？

1. このお薬を服用した後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このお薬の説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息苦しさ、息切れ

2. まれに、次の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、 声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、 息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる

3. このお薬を服用した後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。 **眠気**

このお薬の剤形は？

淡黄褐色澄明の粘稠な液体で、
特異なおいがあり、
味は甘いです。



このお薬に含まれているものは？

成分及び分量 (成人1日量: 18mL中)	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物 45mg クレゾールスルホン酸カリウム 270mg
添加物	エタノール、白糖、カラメル、安息香酸、水酸化ナトリウム、安息香酸ベンジル、エチルバニリン、グリセリン、バニリン、香料

このお薬の保管と取り扱いは？

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に、密閉して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 計量カップは、使用後水洗いなどして、清潔に保管してください。
- (5) キャップをしめる際は、びんの口をよく拭いてからしめてください。ビンの口に薬液が付着したままキャップをしめると、まれに開けにくくなる場合があります。また、閉め方が悪いと内容液が漏れ出たり汚染することがあります。
- (6) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



このお薬を正しくお使いいただくために

用法・用量を超えて服用すると、
重大な健康被害*につながるおそれがあります。

誤って過量服用された場合は
直ちに医師の診察を受けてください。

*吐き気、嘔吐、尿閉、運動失調、錯乱、興奮、神経過敏、幻覚、呼吸抑制、強い眠気等

【適正使用のためのご協力のお願い】

原則として、1人1箱でのご購入にご協力ください。なお、1箱を超えて購入しようとする場合はその理由の確認、若年者（高校生、中学生等）のお客様については、身分証等による氏名及び年齢の確認、また他の販売店においての本剤の購入履歴を確認させていただく場合があります。

このお薬についてのお問合せ先は？

シオノギヘルスケア株式会社

大阪市中央区北浜 2丁目6番18号

医薬情報センター


大阪：06-6209-6948

東京：03-3406-8450

受付時間 9時～17時（土、日、祝日を除く）

【あなたとあなたの大切な人を守るために】

医薬品を用法・用量を守らずに過量に摂取する「オーバードーズ」は、健康被害を引き起こしたり、やめられなくなったりするおそれがあります。自分や周囲の人が苦しんでいる場合、医師または薬剤師に相談しましょう。



こちらにアクセスいただくと
様々な相談窓口情報を
ご覧いただけます。