



鎮咳去痰薬

日本薬局方 チペピジンヒベンズ酸塩錠

販売名：アスベリンせき止め錠Pro20

アスベリン®せき止め錠Pro20

第2類医薬品

SHIONOGI

アスベリン®せき止め錠Pro20は、チペピジンヒベンズ酸塩がせき中枢に直接作用し、
せきをしずめるとともに、たんを出しやすくするせき止め薬です。



よくお読み
ください

使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用がおこりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人
(3) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
(4) 次の症状のある人 高熱

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用
を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、便秘、口の渇き、胃部不快感・お腹がはる、 軟便・下痢、腹痛
精神神経系	めまい、眠気、不眠、興奮

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診
療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、 のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。

3. 5～6 回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って
医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
4. 症状の改善が見られても 2 週間を超えて服用する場合は、医師、薬剤師または
登録販売者にご相談ください



効能・効果

せき、たん



用法・用量

次の量を水またはぬるま湯でおのみください。
また、おのみになる間隔は 4 時間以上おいてください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人 (15 才以上)	2 錠	3 回
8 才以上 15 才未満	1 錠	
8 才未満	服用させないこと	

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 錠剤の取り出し方
右図のように錠剤の入っている PTP シートの凸部を指先で
強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出しておのみくだ
さい。(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に
突き刺さるなど思わぬ事故につながる可能性があります。)

錠剤の取り出し方



お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。
●シオノギヘルスケア株式会社「医薬情報センター」
電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450
受付時間：9時～17時(土、日、祝日を除く)

「副作用被害救済制度」について
●(独)医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)

®:「ASVERIN/アスベリン」はニプロ株式会社の登録商標です。

製造販売元

シオノギヘルスケア株式会社

大阪市北区大深町5番54号

【アスベリン®せき止め錠Pro20のご使用に際して】

✕「せき・たん」をしずめる目的以外で使用しないでください。

アスベリン®せき止め錠Pro20を有効かつ安全にご使用いただくために、用法・用量などの使用方法が定められています。用法・用量を超えて服用すると、重大な健康被害につながるおそれがあります。ご使用の際は、「使用上の注意」をよく読んで、用法・用量などを厳守して正しくご使用ください。

こちらにアクセスいただくと、
さまざまな相談窓口情報をご覧いただけます。



↑相談窓口情報

誤って過量服用された場合は直ちに医師の診察を受けてください。

せきがひどくなる前に。予防が大切です。

1 「うがい」をしましょう。




のどの粘膜には、空気中から取り込んだウイルスや菌が付着していることも。ウイルスや菌を体内に入れてしまわないよう、うがいをすることを習慣にしましょう。

2 「手洗い」をしましょう。



あらゆるものに触れる手には、ウイルスや菌が付着している可能性が。石鹸とお湯を使った手洗いを、こまめに行うことを心がけましょう。手をいつも清潔に保ちましょう。

3 定期的に水分を 摂りましょう。



のどはウイルスや菌などの異物を排出する役割を担っています。のどが乾燥すると、この機能が低下してしまいます。こまめに水分補給を行い、のどが潤った状態を保ちましょう。

「せきが出る…」そんな時は、せきエチケットを守りましょう。

1 マスクを着用する。 (口・鼻を覆う)



2 ティッシュ・ハンカチで 口・鼻を覆う。



3 袖で口・鼻を覆う。



3週間以上せきが続く場合は、市販せき止め薬を服用せず
病院を受診するようにしてください。

